

セフェム系抗生物質製剤

**泌乳期用スペクトラゾール<sup>®</sup>**  
**Spectrazol<sup>®</sup> milking cow**

(セフロキシウムナトリウム油性乳房注入剤)

泌乳期用スペクトラゾールは、セフェム系抗生物質であるセフロキシムナトリウムを有効成分とする牛の泌乳期乳房炎治療剤である。

セフロキシムナトリウムは、牛乳房炎の主要な起因菌であるブドウ球菌、レンサ球菌、コリネバクテリウムなどのグラム陽性菌はもとより、最近増加している大腸菌、クレブシエラなどのグラム陰性菌に及ぶ広い抗菌スペクトルを有している。また、その作用は殺菌的である。

## 成分・分量

1 容器 (3g) 中

セフロキシムナトリウム.....250mg (力価)  
青色 1 号.....25mg

## 効能・効果

有効菌種：ブドウ球菌、レンサ球菌、コリネバクテリウム、大腸菌、クレブシエラ

適応症：牛；泌乳期乳房炎

## 用法・用量

1 日 1～2 回計 3 回搾乳後に 1 乳房当たり 1 容器〔セフロキシムナトリウムとして 250mg (力価)〕を注入する。

## 使用上の注意

## 【一般的注意】

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (4) 本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。

(5) 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は薬事法第 83 条の 4 の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物[牛(泌乳しているものに限る。)]について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

牛(泌乳しているものに限る。): 食用に供するためにと殺する前 2 日間

又は食用に供するために搾乳する前 72 時間

#### 【使用者に対する注意】

(1) 取扱いに際しては、眼や皮膚に付着しないように注意すること。眼や皮膚に付着した場合には、直ちに水で洗い流すこと。

#### 【牛に対する注意】

##### 1. 副作用

(1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

##### 2. 適用上の注意

(1) 本剤を注入する時は乳頭を十分に消毒すること。

#### 【取扱い上の注意】

(1) 最終有効年月までに使用すること。

(2) 注入ノズルは清潔に取扱うこと。

(3) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

(4) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に  
従い処分すること。

#### 【保管上の注意】

(1) 小児の手の届かないところに保管すること。

(2) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

貯 法：室温

有効期間：24 ヶ月

包 装：3g 容器×12

製造販売元（輸入）

**オガセ医薬品株式会社**  
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

発売元

**株式会社インターベツト**

キャトル&スワイン事業部  
〒102-8667  
東京都千代田区九段北一丁目13番12号  
TEL. 03-6272-1099 FAX. 03-6238-9080

 **MSD**  
Animal Health